

茶園での農薬散布 使用例

1～2茶期

防除期	薬剤名	散布濃度	摘採前日数	使用回数	対象病害虫
1月中～2月末	プルートMC	1000倍	45日		クワシロカイガラ
2月下～3月中旬	ベブドー(水)	500倍	14日	2回	赤焼病、灰色カビ病
	ダニゲッター(F)	2000倍	7日	1回	カンザワハダニ
4月上旬	アクテリック(乳)	1000倍	7日	1回	アブラムシ、カンザワハダニ
5月中旬	スターマイト(F)	2000倍	7日	1回	カンザワハダニ
	ファルコン(F)	4000倍	7日	2回	コカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ
5月下旬	コテツ(F)	2000倍	7日	2回	ウンカ、スリップス
	オンリーワン(F)	2000倍	7日	1回	炭疽病、もち病

2茶後～夏期

防除期	薬剤名	散布濃度	摘採前日数	使用回数	対象病害虫
6月下旬	アミスター(F)	2000倍	14日	3回	輪斑病、新梢枯死症
	ウララDF	1000倍	7日	1回	ウンカ、スリップス
	マッチ(乳)	2000倍	7日	1回	コカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、シャクトリ
7月上旬	スコア(顆)	2000倍	14日	2回	炭疽病、褐色円星病
	サムコル(F)	2000倍	3日	1回	コカクモンハマキ、チャノホソガ
7月中旬	オルトラン(水)	1000倍	30日	2回	ウンカ、スリップス
	ファルコン(F)	4000倍	7日	2回	コカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、シャクトリ

秋芽期～最終

防除期	薬剤名	散布濃度	摘採前日数	使用回数	対象病害虫
8月上中旬	インター(F)	5000倍	7日	2回	炭疽病、もち病
	ハチハチ(乳)	1000倍	14日	1回	ウンカ、スリップス、サビ・ホコリダニ
	フェニックス(顆)	2000倍	7日	1回	コカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、シャクトリ
8月下～9月上旬	オンリーワン(F)	2000倍	7日	1回	炭疽病、もち病
	コテツ(F)	2000倍	7日	2回	ウンカ、スリップス、サビ・ホコリダニ
10月下～11月上旬	ボルドー(水)	500倍	14日		赤焼病
	エンセダン(乳)	1000倍	最終摘採後	1回	カンザワハダニ、ハトジ類

* 散布例です。地域、気候等で散布時期、病気や虫の発生が異なります。

* 茶園に応じた散布をしてください。